

# Probeklausur-1 Kinematik & Dynamik SS 2016, 27.5.2016

Bitte deutlich in DRUCKSCHRIFT schreiben!

Name, Vorname:

Matr.-Nr.:

Studiengang:

1	
2	
3	
$\Sigma$	
T	

Bitte ankreuzen!

Studienbegleitende Prüfung

Übungsscheinklausur


## Theorieaufgaben

1. Geben Sie die Maßeinheiten in den SI-Einheiten 1, kg, m und s an:

Potentielle Energie $E^{\text{pot}}$	
Impuls $\underline{p}$	
Wegfederkonstante $c$	
Winkelbeschleunigung $\ddot{\varphi}$	


2 Punkte

2. Ein ruhendes Seil ist gemäß der Skizze mit einem Umschlingungswinkel  $\alpha$  um einen Poller gelegt. Es gelte  $F_1 > F_2$  und der Haftungskoeffizient zwischen Seil und Poller hat den Wert  $\mu_0$ .  
 Welcher Zusammenhang gilt dann zwischen  $F_1$  und  $F_2$ ?




1 Punkt

3. Der Punkt  $P$  bewegt sich auf dem Kreis mit dem Radius  $R$  mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ . Geben Sie für den Punkt  $P$  in der kartesischen Basis  $\underline{e}_x, \underline{e}_y$  den Geschwindigkeitsvektor  $\underline{v}(\varphi)$  als eine Funktion des Winkels  $\varphi$  an. Gegeben:  $R, \omega$



1 Punkt

4. Eine lineare Feder mit Steifigkeit  $c$  wird um den Wert  $\Delta x$  vorgespannt. Dann schießt die Feder die Masse  $m$  nach oben. Dabei entspannt sich die Feder. Bis in welche maximale Höhe  $h$  fliegt die Kugel (ohne Luftwiderstand)?



$h =$

Geg.:  $m, c, \Delta x, g$ .

1 Punkt

5. Gegeben sei die Geschwindigkeit  $v(x) = Ae^{Cx}$  eines Massenpunktes in Abhängigkeit seines Ortes  $x(t)$ , wobei  $A = \text{const.}$  und  $C = \text{const.}$  im Ort sich nicht ändern. Berechnen Sie die Beschleunigung  $a(x)$  in Abhängigkeit des Ortes  $x(t)$ !

1 Punkt


6. Die potentielle Energie ist gegeben durch  $E^{\text{pot}} = -\frac{1}{2}m\omega^2x^2 + mgy$ . Bestimmen Sie die dazugehörige Kräfte  $F_x$  und  $F_y$ !  $m, g$  und  $\omega$  sind konstant.

$F_x =$

$F_y =$


1 Punkt

7. Der dargestellte Klotz haftet auf dem Boden. Die Gewichtskraft des Klotzes  $G$  ist vorgegeben als  $G = 2\text{N}$ . Kennzeichnen Sie rechts den gesamten Bereich, in dem  $K$  liegen kann, damit das System in Ruhe bleibt.



1 Punkt

8. Welcher der skizzierten Beschleunigung-Zeit-Verläufe  $a(t)$  gehört zu dem gegebenen Weg-Zeit-Verlauf  $s(t)$ ? Bitte kreuzen Sie an!




1 Punkt

## Rechenteil

1

(13 Punkte)

Ein mechanischer Basketballspieler wirft den Ball immer unter dem Winkel  $\alpha$  mit der Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  ab. Benutzen Sie für ihre Rechnung ein Koordinatensystem, das im Ausgangspunkt des Balles liegt.




- Berechnen Sie zunächst  $\underline{x}(t)$ .
- Berechnen Sie daraus die Endzeit  $t_e$ , nach welcher der Ball die Strecke  $d$  zurückgelegt hat.
- Wie groß muss die Abwurfgeschwindigkeit  $v_0$  sein, damit der Ball den Korb trifft?
- Ab welcher minimalen Entfernung  $d$  von der Wand hat er keine Möglichkeit mehr zu treffen?

Geg.:  $\alpha$ ,  $h$ ,  $d$ , Erdbeschleunigung  $g$

**2** (14 Punkte)

Der dargestellte Balken ist mit einer Kraft  $F > 0$  belastet. Es soll das Knickproblem untersucht werden. Die zugehörige Differentialgleichung und ihre Lösung lauten:



$$w''''(x) + \alpha^2 w''(x) = 0 \quad \text{mit} \quad \alpha^2 = \frac{F}{EI}$$


$$w(x) = A \cos(\alpha x) + B \sin(\alpha x) + C \alpha x + D \quad (2)$$

- Formulieren Sie vier Randbedingungen und verwenden Sie diese mit (2), um 4 Gleichungen für die 4 Konstanten in (2) aufzustellen.
- Bestimmen Sie die Eigenwertgleichung (charakteristische Gleichung).
- Berechnen Sie die kritische Last  $F_{\text{krit}}$ .
- Skizzieren Sie in einem Diagramm den qualitativen Verlauf der 1. und 2. Eigenform des Systems. Nehmen Sie dazu  $A = w^*$  an. Achten Sie darauf dass die Randbedingungen deutlich sichtbar sind und tragen Sie die Amplituden der Verläufe ein.

Geg.:  $l, EI, F$

**3** (13 Punkte)

Ein starrer Balken (Länge  $l$ ) mit vernachlässigbarem Gewicht wird bei  $A$  über ein Loslager reibungsfrei geführt und trägt an ihrem unteren Ende einen Klotz der Masse  $M$ , der auf einer rauhen Unterlage liegt. An dem Balken ist ein Seil befestigt, an dem die Masse  $m$  hängt (reibungsfreie Rolle).



- Schneiden Sie zunächst die Massen und den Balken frei und stellen Sie die Gleichgewichtsbeziehungen auf.
- Berechnen Sie die Seilkraft, die Lagerkraft in Punkt  $A$  und die Reaktionskräfte zwischen Klotz und Balken.
- Wie groß muss  $M$  mindestens sein, damit das System gerade noch in Ruhe ist? Benutzen Sie dazu COULOMBSche Reibungsgesetz.

Gegeben:  $l, \beta, M, m, \mu, g$